

Godkänt
2024-03-27
Giltigt t.o.m
2027-03-27

Versionsnummer
1.0
Diarienummer

Intervention DT-myelografi patientinformation

Bild- och funktionsmedicin Dalarna

DT-myelografi är en kontrastundersökning av ryggmärgskanalen där vi sprutar in kontrastvätska i ryggmärgsvätskan innan vi utför en DT-undersökning av ryggen. Den utförs i de fall magnetkameraundersökning av ryggen inte är möjlig.

Om du är gravid eller överkänslig mot röntgenkontrast måste du informera den läkare som skickat remissen till undersökningen så snart som möjligt.

Äter du blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du berättar det för oss innan undersökningen. Vissa blodförtunnande läkemedel kan behöva pausas ett par dagar innan undersökning och det ska du ha fått information om.

Efter undersökningen kommer du att få ligga kvar på sjukhuset i 4 timmar för observation. Du får äta och dricka som vanligt, rikligt med dryck rekommenderas. Det går bra att resa sig upp kortare stunder för mat eller toalettbesök.

Om du därefter mår bra får du åka hem igen om ansvarig läkare på avdelningen bedömer att det går bra och du har sällskap hemma fram till nästa morgon. Om du får huvudvärk eller andra symtom får du stanna kvar på vårdavdelningen över natten.

De första 24 timmarna efter undersökning bör du undvika att luta dig framåt då kontrastvätskan är tyngre än ryggmärgsvätskan och rinner mot den lägsta belägna punkten.

Du bör undvika tungt fysiskt arbete och ska inte framföra något fordon eller använda tyngre maskiner under de första 24 timmarna efter undersökningen.

Sticket i ryggen innebär en risk för så kallad postspinal huvudvärk som gör ont när man står upp men som går över i liggande. Denna typ av huvudvärk ger oftast med sig inom ett par dagar men om du skulle uppleva besvärande huvudvärk eller andra symtom ska du höra av dig till den avdelning där du låg kvar på kontroll.