

Godkänt: 2024-11-06
Giltigt t.o.m: 2027-11-06

Ver.nr: 6.0
Dnr:

Intervention myelografi lumbal remittent

Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

Indikation/frågeställning

DT-myelografi kan utföras då MRT är kontraindicerat för frågeställning om tx spinal stenosis, diskbråck eller tumör i spinalkanalen. Om så önskas i remiss kan även enbart lumbal punktion med provtagning utföras utan kontrastinjektion.

Kontraindikation

- Tidigare allvarlig kontrastmedelsreaktion.
- Ej korrigerbar ökad blödningsbenägenhet.
- Infektion i punktionsområdet.
- Sedvanliga kontraindikationer för lumbalpunktion.

Remissinnehåll

- Aktuell anamnes och status. Om patienten behandlas med blodförtunnande medel skall detta anges och sättas ut inför undersökningen.
- Aktuell DT-undersökning av ländryggen ska finnas.
- Eventuellt tolkbehov.

Patientförberedelser

- Patienten ska vara informerad om vad undersökningen innebär.
- Patienten ska ha plats på vårdavdelning och komma klädd i operationsskjorta och underkläder.
- Fungerande perifer infart.
- Blodförtunnande medicinering skall som regel sättas ut enligt separat dokument.
- Eventuella övriga mediciner kan tas som vanligt.
- Provtagning PK, APT och Trombocyter.
- Eventuella smycken i undersökningsområdet skall vara borttagna.

Kontrastmedel/läkemedel

- Omnipaque 180 mg I/ml

Eftervård

Gäller vid punktion med 22 G 0,7 mm nål.

- Sängläge med höjd huvudända ca 10-20° i 4 timmar.
 - Patienten ska undvika att böja sig framåt för att undvika kontrastpassage till huvudet.
 - Efter avslutad undersökning får patienten äta och dricka som vanligt. Rikligt med dryck rekommenderas.
 - Patienten får resa sig upp kortare stunder för mat eller toalettbesök.
 - Om patienten mår bra efter 4 timmars observation kan han/hon åka hem om ansvarig avdelningsläkare bedömer så. Detta under förutsättning att patienten inte är ensam utan har sällskap fram till nästa dag. I andra fall, eller vid sänkt kramptröskel, bör patienten kvarstanna på vårdavdelning under 24 timmar.
 - Patienten ska undvika tungt fysiskt arbete och får inte köra bil eller nyttja maskiner inom 24 timmar efter undersökningen.
 - Biverkningar som illamående, kräkning, huvudvärk och yrsel kan förekomma. Eventuell postspinal huvudvärk går i allmänhet över i liggande och brukar ge med sig inom några dagar.
-