

Godkänt: 2025-10-03
Giltigt t.o.m: 2028-10-03

Ver.nr: 5.0
Dnr:

MRT tunntarm remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Mb Crohn. Endast remiss från gastroenterolog eller kirurg.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD eller kvarlämnade elektroder.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator, ej programmerbar
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT, framför allt under första trimestern, om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Anamnes och status. Coloskopifynd, F-Calprotectin. Ileussymptom, ev. tidigare operationer/tarmresektioner.

Patientförberedelser

Flytande kost 1 dygn före undersökningen. Fasta 4 tim.

Kontrastmedel

Dotarem/Clariscan 0,2 ml/kg.

Läkemedel

T. Primperan 1 mg. Buscopan eller Glucagon im.

Utförande

Patienten får dricka 1,5 liter vatten blandat med Nutilus-pulver och Sorbitol under 30-45 minuter före undersökningen. Patienten undersöks i bukläge.

Eftervård

-
