

Provtagning för spermaanalys efter sterilisering

Läs noga igenom denna information före provtagning!

Förberedelser

Det är ganska vanligt att proverna innehåller några spermier som är orörliga. För att undvika detta bör mannen innan provtagning vänta ca 3 månader efter utförd vasektomi, samt under denna period ha haft minst 20-30 utlösningar.

Vid förekomst av spermier i provet lämnas eventuellt ytterligare prov, tills dess att inga spermier påvisas.

Gör så här

1. Märk plastburken som provet ska tas i med personnummer och namn.
2. Provet tas med masturbation. Det är viktigt att hela spermaprovet samlas upp i plastburken.

Inlämning

Remiss och denna blankett lämnas tillsammans med provet till Avdelning för Klinisk Patologi och Cytologi i Falun.

Måndag till torsdag, mellan klockan 07.30 och 16.00.

Provet kan också skickas med post, så det når avdelningen mån-torsdag.

Vid återbesök p.g.a. hög spermiekoncentration (direktprov)

Måndag till torsdag, mellan klockan 07.30 och 12.00 Obs. inom en timme efter provtagning, bevara provet kroppsnära då det är känsligt för temperaturväxlingar. Det går bra att ta provet på plats.

Semesterstängt under veckorna 26 – 33.

Prov som inkommer per post under denna period kommer att kasseras p.g.a. begränsad hållbarhet.

Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi finns på Falu lasarett.

Gå direkt till höger efter informationsdisken vid stora entrén och följ sedan skyltarna.

Frågor kan besvaras på telefon 023-49 27 97

Postadress: Avd. för Klinisk Patologi & Cytologi
Falun lasarett, 791 82 Falun

Personnummer: _____

Namn: _____

Föregående sädesuttömning den: _____

Prov taget den: _____ KI: _____ inlämnat KI: _____